

# LEGENDA

Il seguente schema mostra le chiavi di lettura della classificazione assegnata ai campioni inviati

## CLASSIFICAZIONE DEGLI UCCELLI GIOVANI IN FASE DI MUTA POST-GIOVANILE

- 1) La classificazione degli uccelli giovani non esprime l'età in termini di mesi di vita. Le tre classificazioni indentificano gli uccelli "precoci" (**JC1 – JC0**) nati presumibilmente nel primo periodo riproduttivo (maggio/giugno), dagli uccelli "tardivi" (**JC2**) nati presumibilmente nel periodo riproduttivo successivo (luglio/agosto)
- 2) Nel primo anno di vita i giovani uccelli non mutano le remiganti primarie (**P**) e secondarie (**S**), si parlerà pertanto obbligatoriamente sempre di **MUTA SOSPESA**.

**JC2** Giovane (**tardivo**) il cui stato di muta evidenzia il completamento della muta delle Grandi Copritrici Secondarie (**GCII**)

**JC1** Giovane (**precoce**) il cui stato di muta evidenzia la muta parziale (1/2) delle tre penne che costituiscono l'alula cosiddette Polliciali (**Pol**)

**JC0** Giovane (**precoce**) il cui stato di muta evidenzia oltre alla muta completa delle Grandi Copritrici Secondarie (**GCII**) anche la muta totale delle tre penne cosiddette Polliciali (**Pol**)

## CLASSIFICAZIONE DEGLI UCCELLI ADULTI IN FASE DI MUTA POST-NUZIALE

- 1^ Categoria – **A<sup>N+1</sup>** - Adulti in prima **MUTA POST-NUZIALE SOSPESA**  
2^ Categoria – **A<sup>N+X</sup>** - Adulti in " x " **MUTA POST-NUZIALE SOSPESA**  
3^ Categoria – **AC<sub>0</sub>** - Adulti in **MUTA POST-NUZIALE TERMINATA**

- 1) La classificazione degli uccelli adulti non esprime l'età in termini di mesi/anni di vita.
- 2) Gli uccelli adulti della categoria **A<sup>N+1</sup>** presentano nella livrea tipica dell'uccello adulto caratteristiche e tratti del piumaggio tipicamente giovanile. Trattasi di uccelli che hanno vissuto la prima (ed unica) stagione riproduttiva.
- 3) Gli uccelli adulti della categoria **A<sup>N+X</sup>** presentano un piumaggio esclusivamente adulto. Trattasi di uccelli di più anni di vita, quindi che si sono sicuramente riprodotti.
- 4) Gli uccelli adulti della categoria **AC<sub>0</sub>** presentano la livrea tipica dell'uccello adulto il cui stato di muta essendo terminato impedisce di assegnare una diversa classificazione. In teoria potrebbe trattarsi di uccelli che hanno iniziato la migrazione in periodo molto avanzato, oppure che non avendo partecipato alla stagione riproduttiva o avendola terminata precocemente, hanno avuto il tempo di completare il ricambio del piumaggio.
- 5) Agli uccelli appartenenti alle categorie **A<sup>N+1</sup>** e **A<sup>N+X</sup>** viene assegnata una classe di appartenenza sulla base delle piume non mutate rilevate. Le classi sono evidenziati con il suffisso:
  - **C1** : uccelli che presentano una muta parziale delle copritrici sotto alari primarie (**GC 1 INF.**) e secondarie (**GC 2 INF.**)
  - **C2** : uccelli che presentano una muta parziale delle copritrici sotto alari primarie (**GC 1 INF.**) e secondarie (**GC 2 INF.**) ed inoltre una muta parziale delle remiganti secondarie sopra alari (**S**)